

Zvýšená chorobnosť a úhyn mladých holubov v lete 2011

MVDr. Darina Pospíšilová, PhD., VETSERVIS, s.r.o., Nitra, e-mail: pospisilova@vetservis.sk



Na výstave zvierat počas výstavy Agrokomplex 2011 sa viacerí chovatelia stňovali na zvýšenú chorobnosť a úhyn mladých holubov v chovoch poštových holubov v oblasti južného a západného Slovenska. Na základe vyšetrenia holubov z postihnutých chovov, zaslaných na vyšetrenie do laboratória VETSERVIS, s. r. o., Nitra možno predpokladať, že príčinou je **chlamydiôva infekcia**.

Chlamydiôza vtákov je latentná, kontaktná infekcia vtákov vznikajúca po strese. Prejavuje sa dýchacími a tráviacimi poruchami. Je to infekcia, ktorú podmienujú zlé zoohygienické podmienky, dlhotrvajúca preprava, nekvalitné kŕmenie. Pretekárské holuby zvyknú ochorieť 2 až 4 týždne po súťaži. Tieto zvyčajne donesú infekciu do chovu. Mláďatá sú vnímateľnejšie, ochorenie u nich prebieha s výraznejšími klinickými príznakmi. Pôvodca – *Chlamydia psittaci* sa množí hlavne v pľúcach, vzdušných vakoch a perikarde, preniká do pečene, sleziny, svalov. Už za 24 hodín je možné chlamydiu dokázať v truse.

Zdrojom nákazy je voľne žijúce migrujúce vtáctvo, divé holuby. V súčasnej dobe veľké nebezpečenstvo predstavuje nekontrolovaný dovoz, prevoz a predaj (burzy) exotických vtákov z rôznych zdrojov, kde je možnosť zavlečenia nákazy – rôznych kmeňov chlamydií s odlišnými patogennymi vlastnosťami.

Infekcia môže mať akútny alebo chronický priebeh, veľmi častá je aj latentná infekcia bez výrazných klinických prejavov. Z možných klinických príznakov sa zistuje nechutenstvo, ospalosť, slabosť, nazelenalá hnačka, postupné chudnutie, zježené perie, výtok z očí a nosových otvorov, liahnu sa málo životoschopné holúbätá. V dôsledku dlhodobej hnačky či výtokov z očí je perie okolo kloaky a očí vypadane. Zrýchlené dýchanie ako začínajúci zápal pľúc a nervové príznaky – poruchy pohybu, záškly sú tiež možné prejavy infekcie. Patologicko-anatomický nález poukazuje na zápal seróznych blán, možný je nález fibrínu, nápadná je vychudnutosť a atrofia hlavne prsnnej svaloviny.

U holubov je inkubačná doba 5 až 15 dní aj dlhšia. Zvyčajne klinicky ochorejú mladé holuby do veku 6 mesiacov, u starých holubov býva priebeh latentný.

Chovatelia holubov, ktorých chov je postihnutý chlamydiou infekciou zvyknú zvieratá často preliečovať antibiotikami, ktoré majú krátkodobý efekt. Takéto živelné podávanie antibiotík máva za následok oslabenie zvierat

v chove s častým náležom plesní vo vnútorných orgánoch, najčastejšie v pľúcach a na vzdušných vakoch. Imunitný systém takto postihnutých jedincov sa nevie brániť žiadnej infekcii, zvieratá postupne chradnú a hynú. V chove sa začnú prejavovať aj iné infekčné choroby.

Po preliečení chlamydiovej infekcie antibiotikami často vznikne latentná forma choroby. Latentne choré zvieratá vylučujú chlamydie do prostredia a sú zdrojom nákazy pre ďalšie jedince. Najlepšie je, keď sa zvieratá vyliečia bez pomoci antibiotík vlastnými obrannými mechanizmami, čo možno podporiť dobrou zoohygienou, nezaťažovaním zvierat veľkým výkonom, kvalitným, čerstvým a plnohodnotným krmivom, aj prípravkami podporujúcimi nešpecifickú odolnosť zvierat (rastlinné látky, probiotiká, prebiotiká). Po prekonaní infekcie nevzniká trvalá imunita, preto zvieratá sú znova na infekciu náchylné. Protilátky proti chlamydiám vznikajúce v organizme pri zdolaní infekcie môžu navodiť alergickú reakciu, ktorá sa môže prejavíť pri ďalšom kontakte organizmu s chlamydiami.

Chlamydiôza vtákov je prenosná na iné druhy zvierat aj na človeka. Sú známe väzne ochorenia ľudí, ktorí sa infikovali od exotických vtákov aj od holubov. Preto pri riešení chlamydiovej infekcie v chove je potrebné postupovať veľmi zodpovedne.

V prevencii proti chorobe je najdôležitejšie udržovať zvieratá v dobrém zdravotnom stave, podporovať ich celkovú odolnosť kvalitnou zoohygienou a krmivom a neoslabovať ich zbytočným stresom a chemickými látkami.

VÝSLEDOK VYŠETRENIA MLADÉHO HOLUBA:

Anamnéza: zvýšená chorobnosť aj hynutie mladých holubov v chovoch poštových holubov (okolie Bratislavu, južné Slovensko – leto 2011). Klinické príznaky – hnačka, chudnutie, chradnutie mladých jedincov, staršie holuby sú bez klinických príznakov.

Patologicko – anatomický nález: zlý výživný stav, v telovej dutine na serózach ojedinele žlté uzlíky veľkosti prosa (môže sa jedná o fibrín alebo plieseň – aspergilóza)

Bakteriologické a mykologické vyšetrenie: negatívne

Ďalšie vyšetrenia potvrdili vysoké protilátky proti chlamydiám, zvýšený titer protilátky proti paramyxovírusom, čo môže byť dôsledkom vakcinácie, o ktorej sme však nemali anamnestické údaje.

V truse – oocysty kokcidií +++, bez pat. anatomickeho nálezu

svedčiaceho o kokcidióze. Nález väčšieho počtu oocyst kokcidií v truse môže svedčiť o oslabení imunity, resp. inom strese pôsobiacom na zvieratá, ale nie je v tomto prípade príčinou zvýšených úhynov zvierat!

VÝSLEDKY VYŠETRENIA MLADÉHO HOLUBA A STARŠEJ HOLUBICE:

Anamnéza: zvýšená chorobnosť aj hynutie mladých holubov. Zelená hnačka, chudnutie, napriek zachovalej chuti, chradnutie mladých jedincov. Časté preliečovanie zvierat antibiotikami.

Patologicko – anatomický nález: zlý výživný stav, zelený obsah v žalúdku, zeleno sfarbená hnačka u obidvoch zvierat.

Bakteriologické vyšetrenie: negatívne

Mykologické vyšetrenie: viacero druhov plesní, ktoré masívne a rýchlo rastli z tkaniva plúc.

Ďalšie vyšetrenia potvrdili vysoké protilátky proti chlamýdiám, zvýšený titer protilátok proti paramyxovírusom (bez anamnestických údajov o vakcinácii)

V truse - oocysty kokcidií +++, bez pat. anatomického nálezu svedčiaceho o kokcidióze.

Nález väčšieho počtu oocyst kokcidií v truse môže svedčiť o oslabení imunity, resp. nejakom strese pôsobiacom na zvieratá, ale nie je v tomto prípade príčinou zvýšených úhynov zvierat!

Pravdepodobná diagnóza:

Na základe anamnézy, klinických príznakov a sérologického vyšetrenia možno predpokladať chlamýdiovú infekciu v postihnutých chovoch holubov.

Odporečené opatrenia:

- pokiaľ možno zamedziť kontakt domáčich holubov s divo žijúcimi vtákmi
- ak v chove je problém, resp. je predpoklad, že vtáky sú latentne infikované:
 - vyradiť klinicky chorých jedincov – do karantény (upresniť diagnózu – potvrdenie prítomnosti chlamýdií v truse PCR vyšetrenie)
 - vyčistiť prostredie chovných zariadení čo najdôslednejšie od trusu hlavne mechanicky. Urobiť záverečnú dezinfekciu napr. Viroxide super (40 g na 10 litrov teplej vody) – postrek celého chovného zariadenia aj krmítok, napájačiek.
 - holubom v chove predkladať minimálne 6 – 8 týždňov Humac Natur a PROPOUL (Propoul možno podávať pulzne napr. každý druhý týždeň), vitamíny (AMINOVIT, Vitamín A) – podpora nešpecifickej imunity



- na podporu organizmu v boji proti chlamýdiám podávať 7 dní prípravok NEFROVET, potom 7 dní prípravok SILIVET, 7 – 14 dní pauza a opakovať kým v chove prevráva vplyv infekcie
- kvalitné, čerstvé, prirodzené krmivo, odporúčam zaradiť semená maku, ľanu, konope alebo sézamu

- neodporúčam preventívne „preliečovanie“ antibiotikami. Klinicky choré jedince s potvrdenou diagnózou – pozitívna izolácia chlamýdií v truse - liečiť len veľmi vzácné jedince antibiotikami a postupom, ktorý určí veterinárny lekár!
- časté neopodstatnenie podávanie antibiotík v chove zapríčinuje oslabenie imunity zvierat, ich väčšiu náchylnosť na rôzne infekčné choroby, umožňuje uplatnenie plesní v orgánoch zvierat, časté sú plesňové zápaly plúc a vzdušných vakov, chronické hnačky, zvýšené úhyny, málo života schopné mláďatá. V takých chovoch sa aj chlamýdiová infekcia ľahšie uplatní až šíri.

PROPIGEON

probiotický prípravok pre holuby

zlepšenie trávenia a zvýšenie odolnosti organizmu

Obsahuje

- Lactobacillus fermentum – pozitívne vplýva na tráviace procesy a stimuluje imunitný systém
- Maltodextrín – podporuje množenie prospešnej črevnej mikroflóry
- Aquamin – prírodný multiminerálny komplex vyrobený z mineralizovanej morskej riasy Lithothamnion coralloides, ktorý zabezpečuje komplexné zásobenie organizmu minerálnymi látkami a stopovými prvkami
- Zvýšenie obranachopnosti organizmu, kondície a letových schopností
- Pomáha obnoviť prospešnú mikroflóru po podávaní antibiotík a chemoterapeutík.

Dávkovanie

Individuálne:

Preventívne: 1 g na kus a deň minimálne 7 dní do krmiva
Liečebne: 2 g na kus a deň minimálne 7 dní do krmiva

Hromadné: 5 g na 1 kg krmiva

Veľkosť balenia: 200 g, 500 g, 1000 g

